


PRÓSTATA

Estudo fase 3, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo de Pasritamig (JNJ-8343) associado ao melhor tratamento de suporte (BSC) versus BSC para câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC)



KLK2

COMPAS



A calicreína-2 (KLK2) é uma serino-protease expressa quase exclusivamente na próstata. **Pasritamig é um anticorpo bi-específico engajador de células T.** Um de seus domínios se liga à KLK2 expressa nas células tumorais prostáticas, enquanto o outro se liga à proteína CD3 presente nas células T.

Essa ligação simultânea aproxima as células T das células tumorais, promovendo a ativação imune e a destruição das células do câncer de próstata.

Critérios de inclusão:


Pacientes com mCRPC que receberam todas as terapias de prolongamento da vida para as quais são clinicamente elegíveis e têm acesso, incluindo novo agente hormonal, duas linhas de Taxanos, PSMA-Lutécio e iPARP (se BRCA1/2+).

OBS: Pacientes que não têm indicação ou acesso ao Cabazitaxel, PSMA-Lutécio e iPARP podem ser considerados elegíveis, desde que já tenham recebido pelo menos Docetaxel e um novo agente hormonal.

Principais critérios de exclusão:

Doença metastática visceral
PSA < 2

Desenho do estudo:



*BSC (pode incluir adioterapia externa paliativa, baixas doses de corticosteroides, analgésicos, agentes ósseos e procedimentos paliativos necessários a critério médico).